

平成 25年 下常海橋みどり共同防除組合 りんご病害虫防除暦

月	旬	対象病虫害	回数 散布量	散布時期	基準薬剤 及び調合順序	使用時期 収穫前日数	年間使用 回数	1000g 当たり薬量
5/6	4 下	モニリア病 腐らん病 黒星病 リンゴハダニ ハマキムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	1 300g	ふじ展葉1週間後頃	1. 精製マシン油乳剤 200倍 2. ダーズバンDF 3000倍 3. ベフラン液剤 1000倍	発芽後3週間 14日 展葉期	— 2回 6回以内 (開花期以降3回)	5g 334g(2袋) 1000cc(2本)
	5/18	5 上	黒星病 腐らん病 うどんこ病 モニリア病 ミダレカクモンハマキ	2 320g	ふじの開花直前	1. トップジンM水和剤 1000倍 2. インダーフロアブル 5000倍 3. バイオマックスDF 2000倍	前日 14日 前日	6回 3回 —
5/30		5 下	黒星病 腐らん病 うどんこ病 黒点病 斑点落葉病 ミダレカクモンハマキ リンゴコカクモンハマキ ナシヒメシクイ	3 350g	ふじの落花直後	1. スコアMZ水和剤 500倍 2. カスケード乳剤 4000倍 3. バイカルティ 1000倍	60日 14日	3回 2回
	6/14	6 上	斑点落葉病 黒星病 うどんこ病 黒点病 腐らん病 すず斑・すす点病 クワコナカイガラムシ アブラムシ類 ギンモンハモグリガ ナシヒメシクイ	4 420g	ふじの 落花15日後頃	1. スペックス水和剤 600倍 2. スプラサイド水和剤 1500倍 3. バイカルティ 1000倍	45日 30日	3回 2回
6/29		6 中	斑点落葉病 腐らん病 黒星病 すず斑・すす点病 黒点病 炭疽病 褐斑病 モモシクイガ ハダニ類 アブラムシ類 ギンモンハモグリガ	5 500g	6月中旬	1. トレノックスフロアブル 500倍 2. モスピラン水溶剤 4000倍 3. バイカルティ 1000倍	30日 前日	5回 3回
	7/14	7 上	斑点落葉病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 褐斑病 いぼ皮膚病 ハダニ類 モモシクイガ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ シャクトリムシ類	6 500g	7月初め	1. ドキリンフロアブル 1000倍 2. バイスロイドEW 2000倍 3. バイカルティ 1000倍	14日 7日	4回 4回
7/30		7 下	斑点落葉病 褐斑病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 腐らん病 キンモンホソガ ハダニ類 モモシクイガ クワコナカイガラムシ ギンモンハモグリガ	7 500g	7月末	1. ナリアWDG 2000倍 2. ダントック水和剤 4000倍 3. ダニサラバフロアブル 1000倍	前日 前日 前日	3回 3回 1回
	8/14	8 中	斑点落葉病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 褐斑病 ハダニ類 モモシクイガ ギンモンハモグリガ シャクトリムシ類	8 500g	8月半ば	1. ベフラン液剤 3000倍 2. サコルフロアブル 5000倍	前日 前日	6回 3回
8/30		8 下	斑点落葉病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 褐斑病 ハダニ類 モモシクイガ ギンモンハモグリガ シャクトリムシ類	9 500g	8月末	1. フリントフロアブル 2000倍 2. イカズチWDG 1500倍	前日 前日	3回 2回
	9	9 中	すす斑・すす点病		特別散布	1. ストライド顆粒水和剤(3日)又はベフラン液剤(前日)又はベンレート水和剤(前日)		